



## Manejo de riesgo de la enfermedad hemorrágica del conejo: Consejos para organizadores de espectáculos de conejos

Siempre es una buena idea aplicar prácticas de bioseguridad en los espectáculos y ferias, no solo para la enfermedad hemorrágica del conejo (EHC)(RHD en Inglés), sino también para reducir la propagación de enfermedades contagiosas más comunes como la Pasteurelisis respiratoria, los ácaros, etc. Las áreas de mayor riesgo de EHC son aquellas con conejos ferales infectados, ya sean domésticos o silvestres. Todos tenemos diferentes niveles de riesgo que estamos dispuestos a aceptar; los participantes más precavidos no sacarán a sus animales de sus casas ni les permitirán ponerse en contacto con otros animales. La siguiente guía está destinada a las personas que organizan ferias o espectáculos.

### Cómo evitar que las enfermedades entren en un espectáculo de conejos

- Los organizadores deben evaluar los riesgos de enfermedad y decidir qué medidas de control deben establecer y hacer cumplir para evitar que la EHC ingrese y se propague durante los espectáculos. Se debe tomar en cuenta la opinión profesional de los Médicos Veterinarios para ayudar con estas decisiones.
- Los organizadores de espectáculos pueden decidir agregar requisitos adicionales para los expositores y sus conejos antes y durante un evento (por ejemplo, restricciones basadas en la ubicación del hogar original de los conejos, vacunación EHCV2 (RHDV2 en Inglés), certificado de inspección veterinaria o inspección veterinaria a la llegada).
- Manténgase actualizado sobre las [pautas](#) actuales de [ARBA](#) (Siglas en Inglés de la Asociación Americana de Reproductores de Conejos) y del estado de California para los espectáculos.
- El saneamiento efectivo del equipo antes de realizar un espectáculo requiere de dos pasos: limpieza y desinfección (consulte la guía C&D del USDA, enlace [aquí](#)).



#### *Limpieza*

- Retire todos los desechos orgánicos de los elementos que se van a desinfectar (por ejemplo, jaulas, equipo de alimentación, bebederos, calzado, etc.). Es mejor desechar o quemar los artículos hechos de madera después de su uso.
- Lave bien los artículos con agua y jabón; enjuague bien y dejar secar.
- Permita la exposición prolongada a la luz solar cuando sea posible.

#### *Desinfección*

- Sature el equipo por inmersión o rocío con Cloro doméstico (hipoclorito de sodio) diluido al 10%; Virkon®-S diluido al 1% (DuPont) o peróxido de hidrógeno con acelerador (Rescue®)
- Verifique que esté usando un desinfectante que inactive al virus de EHC en las superficies específicas que necesitan limpieza (por ejemplo, metal, tela, etc.)
- Deje que el desinfectante esté en contacto con la superficie durante 10 minutos, luego enjuague y deje secar antes de permitir el contacto con los animales.

### Prevención de la propagación durante el espectáculo

- Limpiar las superficies de exposición entre cada animal. Las superficies de exposición deben estar hechas de un material que se pueda desinfectar fácilmente. La alfombra, tela y madera son mucho más difíciles de desinfectar que el alambre o las superficies lisas de metal.

- Evite que los participantes manipulen a los conejos de otras personas. No comparta alimento, agua o premios con otros expositores.
- Alimente, limpie y dé agua a los animales de manera que se minimice el contacto entre el personal, los conejos y los dueños de conejos. Recomendamos que cada propietario cuide a sus propios conejos; si no es posible, instale bebederos y comederos de tal forma que puedan ser revisados sin tener que manipular las jaulas.
- Obtenga heno de áreas no afectadas por el brote de EHC y guárdelo de manera segura para evitar el contacto con conejos silvestres.
- Mantenga el alimento cubierto o en un recipiente con tapa durante los espectáculos.
- Proporcione estaciones para lavado de manos con agua y jabón o baños cerca del área de exhibición para permitir el lavado frecuente (no se ha comprobado que el desinfectante para manos elimine este virus).
  - Todas las personas que toquen o manipulen conejos deben lavarse las manos antes, después y entre conejos.
  - El personal del espectáculo, los secretarios y los jueces deben minimizar el manejo de conejos de diferentes hogares. Deben lavarse bien las manos con agua y jabón (el desinfectante para manos no es eficaz) antes de tocar conejos de diferentes propietarios. Cuando sea posible, deben usar mangas cortas y evitar levantar o sostener a los conejos para evitar la contaminación de su ropa. Considere la posibilidad de evaluar "sin tocar" durante el brote.
- Implemente un excelente control de vectores. Las moscas, ratas y aves son ejemplos de animales que pueden transmitir virus en sus patas y cuerpo. El uso de redes y trampas para moscas pueden ayudar.
- Reduzca el contacto del público con los conejos. No permita que los espectadores que no forman parte del espectáculo entren a las áreas de los conejos. Cerque el área de exhibición y coloque letreros para ayudar a comunicar la necesidad de una mayor bioseguridad.
- Mantenga a los conejos de exhibición en jaulas alejadas del suelo y no permita el contacto de nariz a nariz entre los conejos en sus jaulas o en la mesa de exhibición.
- No permita que se compartan espacios para estética, herramientas o alfombras de exposición; designar una por animal o conejera.



### **Controles después del espectáculo**

- Limpie y desinfecte el área del espectáculo inmediatamente después del evento.
- Permita un mínimo de 18 días entre diferentes espectáculos\* organizados en el mismo lugar.
- Fomente la notificación anónima de enfermedades a la oficina de su espectáculo durante las 3 semanas posteriores al evento. Mantenga comunicación con todos los asistentes (lista de direcciones de correo electrónico o números de teléfonos celulares).

*\* Recomendamos mantener una separación de por lo menos 18 días entre eventos, ya que los espectáculos independientes contendrán diferentes animales del espectáculo original que viajan desde diferentes regiones con diferentes niveles de exposición a posibles enfermedades. Mantener esta separación entre los espectáculos puede prevenir la contaminación cruzada de animales o equipo, así como proporcionar el tiempo adecuado para la limpieza y desinfección. En este documento, un "espectáculo" es un evento que es organizado por una organización diferente con diferentes expositores. (Por ejemplo: un espectáculo de conejos de dos días para los mismos animales puede ser aceptable, pero se debe evitar la organización de un espectáculo "abierto" de conejos un día antes de una feria del condado).*

**Antes de llevar conejos a espectáculos en otros estados, consulte con el estado de destino los requisitos de entrada para conejos y verifique si sus conejos podrán regresar de ese espectáculo a California. Viajar a estados afectados por EHC y el contacto con conejos de origen desconocido aumenta el riesgo de transmitir EHC a conejos domésticos y salvajes en áreas libres de enfermedades, incluso dentro de un**

**estado con casos positivos de EHC.**

Si tiene más preguntas sobre cómo prevenir la propagación de EHC en las exposiciones de conejos, [comuníquese](mailto:ahbfeedback@cdfa.ca.gov) con [ahbfeedback@cdfa.ca.gov](mailto:ahbfeedback@cdfa.ca.gov).

Para reportar conejos domésticos muertos, comuníquese con su sucursal local de salud animal del CDFA:

**Servicios de Salud Animal y de Seguridad  
Alimentaria, Oficina de Salud Animal**

Sede principal - (916) 900-5002

Distrito de Redding - (530) 225-2140

Distrito de Modesto - (209) 491-9350

Distrito de Tulare - (559) 685-3500

Distrito de Ontario - (909) 947-4462

**USDA-APHIS-VS - (916) 854-3950 o (877) 741-3690**

**Para obtener más información sobre EHC y bioseguridad, visite:**  
[https://www.cdfa.ca.gov/AHFSS/Animal\\_Health/RHD.html](https://www.cdfa.ca.gov/AHFSS/Animal_Health/RHD.html)