



Prácticas de bioseguridad para la minimizar el riesgo de propagación de enfermedades aviares

Expositores de aves

La bioseguridad abarca todas aquellas medidas que usted pueda tomar para proteger a sus aves de enfermedades. En todo momento, las prácticas estándares de bioseguridad son importantes para la comunidad avícola de California. A continuación, le presentamos algunas recomendaciones para los expositores de aves:

Antes de la exhibición

- Guarde a las aves en espacios interiores o, como mínimo, dentro de una zona supervisada.
- Retire las fuentes de alimentos y agua que atraigan plagas, tales como aves acuáticas/terrestres silvestres, roedores e insectos.
- Guarde las distintas especies (por ejemplo, pollos, pavos, patos y gansos) en lugares separados.
- Evite las visitas a otras bandadas en patios traseros u operaciones avícolas y restrinja el acceso de los visitantes a sus aves.
- Evite el contacto directo con la vida silvestre, especialmente aves terrestres/acuáticas silvestres.
- Limpie y desinfecte constantemente las herramientas y equipos.
- Limpie las jaulas y los contenedores de alimentos y agua a diario.
- Lávese las manos y desinfecte sus zapatos después de trabajar con las aves.
- Considere tener botas y ropa exclusivas para trabajar con sus aves.
- Supervise y documente la salud de sus aves a diario.

Si sus aves muestran cualquier signo de enfermedad, no las lleve a la exhibición ni asista a la misma.

- Familiarícese con las señales de enfermedades en sus aves:
 - Muerte súbita,
 - Jadeos, tos, secreción nasal,
 - Diarrea aguada y verde,
 - Depresión,
 - Disminución en la ingesta de alimentos
 - Disminución de la producción o calidad de huevos,
 - Hinchazón o decoloración de los ojos, cabeza, cuello, crestas o moco de pavo, o
 - Temblores, dar vueltas, alas caídas, torsión de la cabeza y cuello.

Para notificar una cantidad inusual de aves enfermas o muertas, llame a la:
Línea de asistencia telefónica para aves enfermas
(866) 922-2473

- Aísle inmediatamente a todas las aves enfermas en una jaula o área alejada del resto de las aves.
- Manipule las aves enfermas solo después de atender a las aves saludables.
- Pregúntele al organizador de la exposición las medidas adecuadas para prevenir enfermedades y cualquier medida específica que pueda ser necesaria si un ave se enferma en la exhibición.



Durante la exhibición

- Limpie las jaulas y los contenedores de alimentos y agua a diario.
- No comparta su equipo con otros expositores; en caso de que deba compartir el equipo, asegúrese de que este se limpie y desinfecte entre usos.
- Evite el contacto con otras aves durante el evento.
- Limite el contacto con las aves al personal esencial, y
- Busque signos de enfermedades en sus aves a diario.
 - Notifique cualquier signo clínico al veterinario designado para la exhibición, inspector de salud avícola o personal adecuado de la exhibición.
 - Retire inmediatamente a las aves enfermas del área de la exhibición.
 - Si su(s) ave(s) muestra(n) signos clínicos de una enfermedad que se deba informar, como la gripe aviar o la enfermedad virulenta de Newcastle, es posible que se le exija la realización de pruebas (muestras de sangre o muestras con hisopos). Dichos resultados se compartirán con el Consultorio del Veterinario Estatal.

Después de la exhibición

- No asista a ningún otro evento con sus aves durante *al menos* dos semanas después de regresar de una exhibición.
- Aísle y observe las aves para detectar enfermedades después de que regrese al sitio de origen y antes de permitir que estas tengan contacto con otros animales,
 - El período de aislamiento/observación para buscar signos clínicos de enfermedad no debe ser menor de 30 días.
 - Manipule primero a las aves saludables que se guardaron anteriormente en el sitio de origen y luego atienda las aves aisladas que asistieron al evento.
- Limpie y desinfecte los equipos, ropa, zapatos y vehículos/remolques que estuvieron en la exhibición,
 - Deje secar completamente todos los artículos que se hayan limpiado y desinfectado antes de reutilizarlos o reponerlos.
- Si los expositores o miembros de la familia contraen enfermedades como la gripe, consulte a su proveedor de atención médica lo antes posible:
 - Infórmele a su proveedor de atención médica sobre el contacto con las aves.
 - Las personas enfermas deben evitar todo contacto con las aves hasta que no muestren signos de fiebre durante al menos 24 horas sin haber utilizado medicamentos para reducir la fiebre.



Fotos cortesía de: Dr. Everardo Mendes (portada), Pixabay (izquierda de la contraportada) y Camille Carey (derecha de la contraportada)



Ejemplos de productos desinfectados*

- **1-Stroke Environ™** - detergente germicida
- **Tek-trol™** - Limpiador desinfectante concentrado
- **Nolvasan®S** - Diacetato de clorhexidina
- **Blanqueador regular de cloro** - EPA: 5873-50 (hipoclorito sódico 6.0%)
- **Lysol Power & Fresh Multi-purpose cleaner®** - EPA: espray de 777-66
- **Purell®** - desinfectante para manos

**Descargo de responsabilidad: los nombres comerciales utilizados en esta publicación no constituyen una garantía ni respaldo de los productos, ni tampoco crítica a productos similares que no se hayan mencionado. La CDFA no se hace responsable de los inconvenientes que surjan como consecuencia de su uso. No se garantiza que estos procedimientos impidan que enfermedades altamente contagiosas afecten a sus aves; sin embargo, reducirán las probabilidades de que esto pase.*

Área de Salud Animal de CDFA

Oficina central - (916) 900-5002
Distrito de Redding - (530) 225-2140
Distrito de Modesto - (209) 491-9350
Distrito de Tulare - (559) 685-3500
Distrito de Ontario - (909) 947-5932
USDA-APHIS-VS. (916) 854-3950 o (877) 741-3690

Para obtener más información, haga clic en los siguientes:

[Área de Salud Animal](#)
[Programa de Salud Aviaria](#)